



بنام خالق زیبایی ها

با تشکر از انتخاب مرکز ما جهت درمان های دندانپزشکی خود لطفا موارد زیر را بدقت مطالعه بفرمایید و انجام دهید.

۱- لطفا بعد از جراحی ایمپلنت و کارگذاری پایه ها در محل جراحی شده فشار های از جویدن کنترل شود و با طرف دیگر غذا جویده شود، همچنین سعی بفرمایید تا مدت یک هفته از غذاهای نرم استفاده بفرمایید، حتی اگر با طرف دیگر میجوید، لازم به ذکر است که ۲ تا ۳ هفته اول خیلی مهم میباشد که به پایه های کار گذاشته شده فشار وارد نگردد.

۲- شستشو با سرم شستشو و یا دهانشویه نقش مهمی در بهبود زخم لثه و همچنین جلوگیری از عفونت ایفا خواهد کرد، پس لطفا از ساعات بعد از جراحی دهان خود را بطور منظم شستشو دهید و این عمل را روزی چندین بار (۴ تا ۵ بار حداقل) در روز انجام دهید، ولی استفاده از دهانشویه را طبق دستور دندانپزشک انجام دهید که اصولا روزی ۲ بار می باشد.

۳- در ۲۴ ساعت اول از مواد غذایی و نوشیدنیهای گرم استفاده نگردد، میتوانید همه چیز میل کنید فقط سرد و نرم باشد.

۴- احتمال آمدن خون آبه از محل جراحی از ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از جراحی طبیعی میباشد و نگران این مسئله نباشید، در جراحی سینوس لیفت باز، احتمال آمدن خون آبه از بینی نیز امکان پذیر است.



۵- از خالی کردن آب دهان با فشار خودداری بفرمایید و اگر آب دهان و حتی خون آبه در دهان جمع گردید لطفا دستمال جلوی دهان خود نگه دارید و به آرامی محتویات دهان را در آن خالی کنید و از تخلیه آن با فشار بپرهیزید زیرا تحرک زخم باعث خونریزی می گردد.

۶- دارو های تجویز توسط دندانپزشک خود از طریق دستور استفاده نمایید و در مورد آنتی بیوتیکهای تجویز شده لطفا کل تعداد تجویز شده را مصرف بفرمایید نه اینکه بعد از ۲ یا ۳ روز مصرف را خودسرانه قطع کنید، که اصولا بدمت ۱ هفته هر ۸ ساعت این داروها مصرف باید گردد.

۷- امکان دارد محل جراحی بعد از گذشت ۲۴ تا ۷۲ ساعت بعد متورم شود که امریست طبیعی، میتوانید بعد از جراحی از کمپرس یخ استفاده نمایید، توجه داشته باشید که اگر برای شما پیوند استخوانی نیز انجام گردیده احتمال این تورم خیلی بیشتر خواهد بود و جای نگرانی نیست بعد از چند روز بر طرف میگردد.

۸- لثه در قسمت جراحی شده امکان دارد بعد از چند روز تغییر رنگ داده و مایل به سفید یا طوسی گردد، نگران این موضوع نباشید و فکر نکنید که عفونت ایجاد شده است زیرا این امر نشانگر بهبود یافتن زخم زخم میباشد.

۹- اگر خون آبه که از محل جراحی ترشح میکند به خونریزی شدید تبدیل شد، میتوانید تکه ای گاز استریل شده از داروخانه تهیه کنید و آنرا تا کرده (با دستان تمیز) و بر روی زخم گذاشته و به آرامی گاز بگیرید بعد از مدتی خونریزی قطع خواهد شد در غیر اینصورت با پزشک خود تماس تماس بگیرید و یا به مراکز درمانگاهی و یا بیمارستانی مراجعه بفرمایید.

info@drsojodi.com



سعادت آباد - پایین تر از چهارراه سرو - بلوار پاکباز

ابتدای خیابان ۱۸ متری مطهری - جنب داروخانه انصاری

پلاک ۱۴ - ط _____ بقه دوم - واحد ۴

۰۲۱-۲۲۳۵۲۸۱۰

۰۲۱-۲۲۱۴۴۸۰۳



۱۰- برای کشیدن بخیه ها بعد از یک هفته با هماهنگی به مراکز مراجعه فرمایید ولی اگر پیوند استخوان نیز برای شما انجام گردیده بعد ۲ هفته مراجعه بفرمایید.

Dr Ali Sojodi khoshabi
Specialty dental implants & Polishing
www.drsojodi.com